

Análisis de los casos de COVID-19 notificados a la RENAVE hasta el 10 de mayo en España

Informe COVID-19 nº 33. 29 de mayo de 2020

Contenido

Introducción	3
Casos notificados de COVID-19 en España	4
Características demográficas, clínicas y epidemiológicas	6
Características clínicas y gravedad	8
Principales resultados	13
Nota metodológica	14
Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas. MoMo	15

Introducción

En diciembre de 2019 surgió un agrupamiento de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan (provincia de Hubei, China), con una exposición común a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo virus de la familia *Coronaviridae* que posteriormente fue denominado SARS-CoV-2¹. La secuencia genética fue compartida por las autoridades chinas el 12 de enero. La enfermedad causada por este nuevo virus se ha denominado por consenso internacional COVID-19. El Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005) declaró el brote como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) en su reunión del 30 de enero de 2020. Posteriormente, la OMS lo reconoció como una pandemia global el 11 de marzo de 2020.

En España, las comunidades autónomas (CCAA) notifican diariamente al Ministerio de Sanidad las cifras de casos confirmados acumulados de COVID-19: total de casos, casos en profesionales sanitarios, hospitalizaciones, ingresos en UCI, fallecidos y casos recuperados.

Al mismo tiempo, las CCAA completan, según acceden a la información, la encuesta individualizada para cada uno de dichos casos. La encuesta incluye información clínico-epidemiológica consensuada y aprobada por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta y la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), y la notifican mediante la plataforma informática SiViES (Sistema para la Vigilancia en España), que gestiona el Centro Nacional de Epidemiología.

¹ <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020>

Este informe contiene el análisis de los casos de COVID-19 **con fecha de diagnóstico anterior al 11 de mayo de 2020** notificados a la RENAVE a través de la plataforma SiViES. A partir de ese día se inició la Estrategia de Diagnóstico, Vigilancia y Control en la Fase de Transición de la Pandemia de COVID-19, que requiere ciertos ajustes en la forma de notificación.

La extracción de datos se realizó el 29 de mayo de 2020 a las 11:00h, y contiene 250.273 casos confirmados por cualquier técnica con fecha de diagnóstico previa al 11 de mayo de 2020. **El objetivo** es obtener una información detallada sobre las características clínicas y epidemiológicas de los casos de COVID-19 y los factores que pueden estar asociados a una mayor gravedad. Los resultados deben confirmarse con posteriores actualizaciones de COVID-19 en SiViES.

Casos notificados de COVID-19 en España

Tabla 1. Distribución por CCAA. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE

CCAA	Casos notificados a la RENAVE ¹
Andalucía	15819
Aragón	6766
Asturias	2690
Baleares	2084
Canarias	2312
Cantabria	2628
Castilla-La Mancha	20477
Castilla y León	23192
Cataluña	55196
C. Valenciana	13777
Extremadura	4991
Galicia	9507
Madrid	64408
Murcia	2301
Navarra	6340
País Vasco	13533
La Rioja	3951
Ceuta	169
Melilla	132
Total	250273

¹Extracción de datos de SiViES confirmados por cualquier técnica a las 11:00 h del 29-05-2020.

Figura 1. Curva epidémica por fecha de inicio de síntomas¹ y fecha de diagnóstico¹ Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE





Figura 2. Curva epidémica de casos de COVID-19 según gravedad. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE



Características demográficas, clínicas y epidemiológicas

Tabla 2. Características demográficas, clínicas y antecedentes epidemiológicos de riesgo. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE¹ (N=250.273)

Características	n*	Total N (%)	Mujeres N (%)	Hombres N (%)	p-valor
Sexo	248329		141571 (56,6)	106758 (42,7)	
Edad. Mediana (RIC) ²	248068	60 (46-79)	59 (44-81)	62 (48-77)	<0,001
Grupo de edad (años)					
<2		381 (0,2)	165 (0,1)	216 (0,2)	
2-4		193 (0,1)	98 (0,1)	95 (0,1)	
5-14		835 (0,3)	394 (0,3)	441 (0,4)	
15-29		15481 (6,2)	10265 (7,3)	5216 (4,9)	
30-39		23570 (9,5)	14841 (10,5)	8729 (8,2)	
40-49		36175 (14,6)	21400 (15,1)	14775 (13,9)	
50-59		43869 (17,7)	25046 (17,7)	18822 (17,6)	
60-69		35197 (14,2)	16883 (11,9)	18311 (17,2)	
70-79		33411 (13,5)	15034 (10,6)	18377 (17,2)	
≥80		58956 (23,8)	37286 (26,4)	21669 (20,3)	<0,001
Síntomas ¹					
Fiebre o reciente historia de fiebre	101523	74057 (72,9)	37099 (68,3)	36949 (79,3)	<0,001
Tos	93105	64281 (69,0)	33961 (67,9)	30314 (71,3)	<0,001
Dolor de garganta	38299	8430 (22,0)	5401 (25,1)	3028 (18,7)	<0,001
Disnea	87744	41727 (47,6)	20708 (44,0)	21017 (52,4)	<0,001
Escalofríos	38003	8843 (23,3)	4855 (22,8)	3987 (24,7)	<0,001
Vómitos	37940	3297 (8,7)	2143 (10,1)	1154 (7,1)	<0,001
Diarrea	39799	10678 (26,8)	6284 (28,1)	4393 (26,0)	<0,001
Neumonía (radiológica o clínica)	125022	67293 (53,8)	29317 (44,7)	37973 (64,6)	<0,001
Síndrome de distrés respiratorio agudo	85864	5846 (6,8)	2242 (4,8)	3604 (9,4)	<0,001
Otros síntomas resp.	69923	6407 (9,2)	2699 (7,1)	3708 (11,8)	<0,001
Fallo renal agudo	86066	4515 (5,2)	1725 (3,6)	2790 (7,3)	<0,001
Enfermedades y factores de riesgo ¹					
Una o más	159343	103573 (65,0)	53867 (61,5)	48401 (68,7)	<0,001
Enfermedad cardiovascular	149636	43420 (29,0)	20309 (24,7)	22889 (34,3)	<0,001
Enfermedad respiratoria	149636	16454 (11,0)	6981 (8,5)	9300 (13,9)	<0,001
Diabetes	149636	24222 (16,2)	11120 (13,5)	12956 (19,4)	<0,001
Hipertensión arterial [†]	149636	31800 (21,3)	17176 (20,9)	14230 (21,3)	0,035
Hospitalización	239815	92113 (38,4)	40585 (30,0)	51363 (49,7)	<0,001
Ventilación mecánica	77414	5809 (7,5)	1900 (4,7)	3909 (10,6)	<0,001
Admisión UCI ³	197163	7695 (3,9)	2340 (2,1)	5344 (6,2)	<0,001
Defunción	250273	20534 (8,2)	8913 (6,3)	11612 (10,9)	<0,001
Contacto estrecho con casos COVID-19 probable o confirmado	13954	7582 (54,3)	4767 (60,9)	2815 (45,9)	<0,001
Contacto con persona con infección respiratoria aguda	15461	8028 (51,9)	5064 (57,0)	2964 (45,1)	<0,001
Profesional sanitario	169694	40961 (24,1)	31351 (32,1)	9606 (13,3)	<0,001
Visita a centro sanitario	8480	1208 (14,2)	729 (16,2)	479 (12,0)	<0,001


¹Los porcentajes se calculan sobre los casos de COVID-19 de los que se dispone de información de cada variable. ²RIC: rango intercuartil. ³UCI: Unidad de cuidados intensivos. *n: número de casos con información sobre la variable. [†]La información sobre hipertensión arterial se recoge a partir del 18-03-2020. Datos actualizados a 29-05-2020.

Tabla 3. Días transcurridos entre el inicio de síntomas y diferentes eventos. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE

	n*	Total Mediana (RIC) ¹	Mujeres Mediana (RIC) ¹	Hombres Mediana (RIC) ¹	p-valor
Hasta diagnóstico (días)	158094	6 (3-11)	6 (3-12)	7 (3-11)	<0,001
Hasta notificación CCAA (días)	168957	6 (3-11)	6 (2-11)	7 (3-11)	0,661
Hasta hospitalización (días)	78698	6 (3- 9)	6 (3-10)	7 (3- 9)	0,035
Hasta ingreso en UCI (días)	4374	9 (6-12)	8 (5-12)	9 (6-12)	0,399
Hasta defunción (días)	17195	11 (7-18)	11 (6-17)	12 (7-18)	<0,001

¹RIC: rango intercuartil. *n: número de casos con información sobre la variable. Datos actualizados a 29-05-2020.

Figura 3. Distribución por edad y sexo. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE y población española



Características clínicas y gravedad

Figura 4. Distribución del número de casos por grupos de edad y situación clínica. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE




Figura 5. Distribución porcentual de casos y defunciones por grupo de edad. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE




Tabla 4.1. Número de casos por grupos de edad y situación clínica. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE, total

Grupo de edad (años)	Casos totales N	Hospitalizados n (%) ¹	UCI n (%) ¹	Defunciones n (%) ¹
<2	381	175 (47,3)	27 (8,4)	2 (0,5)
2-4	193	46 (25,4)	3 (2,1)	0 (0,0)
5-14	835	146 (18,6)	22 (3,5)	1 (0,1)
15-29	15481	1634 (11,0)	92 (0,8)	28 (0,2)
30-39	23570	3825 (16,9)	251 (1,4)	63 (0,3)
40-49	36175	8709 (25,1)	704 (2,5)	217 (0,6)
50-59	43869	14202 (33,7)	1528 (4,5)	658 (1,5)
60-69	35197	17396 (51,0)	2478 (8,7)	1822 (5,2)
70-79	33411	20787 (63,8)	2195 (7,7)	4890 (14,6)
≥80	58956	25007 (44,7)	381 (0,8)	12834 (21,8)
Total	250273	92113 (38,4)	7695 (3,9)	20534 (8,2)

¹Los porcentajes se calculan sobre los casos de COVID-19 de los que se dispone de información de cada variable. Datos actualizados a 29-05-2020.

Tabla 4.2. Número de casos por grupos de edad y situación clínica. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE, mujeres

Grupo de edad (años)	Casos totales N	Hospitalizados n (%) ¹	UCI n (%) ¹	Defunciones n (%) ¹
<2	165	71 (44,9)	9 (6,6)	1 (0,6)
2-4	98	27 (28,7)	2 (2,6)	0 (0,0)
5-14	394	66 (18,0)	6 (2,1)	0 (0,0)
15-29	10265	862 (8,7)	36 (0,5)	11 (0,1)
30-39	14841	1885 (13,3)	90 (0,8)	21 (0,1)
40-49	21400	3612 (17,6)	212 (1,3)	77 (0,4)
50-59	25046	5852 (24,5)	436 (2,3)	192 (0,8)
60-69	16883	6844 (42,1)	693 (5,2)	540 (3,2)
70-79	15034	8417 (57,7)	675 (5,4)	1564 (10,4)
≥80	37286	12939 (36,9)	181 (0,6)	6499 (17,4)
Total	141571	40585 (30,0)	2340 (2,1)	8913 (6,3)

¹Los porcentajes se calculan sobre los casos de COVID-19 de los que se dispone de información de cada variable. Datos actualizados a 29-05-2020.

Tabla 4.3. Número de casos por grupos de edad y situación clínica. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE, hombres

Grupo de edad (años)	Casos totales N	Hospitalizados n (%) ¹	UCI n (%) ¹	Defunciones n (%) ¹
<2	216	104 (49,1)	18 (9,7)	1 (0,5)
2-4	95	19 (21,8)	1 (1,5)	0 (0,0)
5-14	441	80 (19,1)	16 (4,7)	1 (0,2)
15-29	5216	772 (15,4)	56 (1,4)	17 (0,3)
30-39	8729	1940 (23,1)	161 (2,4)	42 (0,5)
40-49	14775	5097 (35,7)	492 (4,2)	140 (0,9)
50-59	18822	8350 (45,9)	1092 (7,2)	466 (2,5)
60-69	18311	10551 (59,1)	1785 (11,7)	1282 (7,0)
70-79	18377	12370 (68,7)	1520 (9,6)	3326 (18,1)
≥80	21669	12067 (58,0)	200 (1,1)	6335 (29,2)
Total	106758	51363 (49,7)	5344 (6,2)	11612 (10,9)

¹Los porcentajes se calculan sobre los casos de COVID-19 de los que se dispone de información de cada variable. Datos actualizados a 29-05-2020.

Tabla 5. Características de los casos según presencia de neumonía¹. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE

Características ¹	Con neumonía n (%)	Sin neumonía n (%)	p-valor
Total	67293 (54)	57729 (46)	
Sexo			
Mujeres	29317 (44)	36341 (63)	
Hombres	37973 (56)	20805 (36)	<0,001
Edad, mediana (RIC) ²	67 (54-79)	53 (40-70)	<0,001
Grupo de edad (años)			
<2	26 (0)	167 (0)	
2-4	19 (0)	81 (0)	
5-14	66 (0)	318 (1)	
15-29	1198 (2)	5370 (9)	
30-39	3062 (5)	7761 (14)	
40-49	7309 (11)	10507 (18)	
50-59	11525 (17)	11357 (20)	
60-69	13017 (19)	6921 (12)	
70-79	14701 (22)	4993 (9)	
≥80	16362 (24)	9593 (17)	<0,001
Enfermedades y factores de riesgo (una o más)	47293 (76)	28327 (54)	<0,001
Enfermedad cardiovascular (sí)	22956 (39)	10445 (22)	<0,001
Enfermedad respiratoria (sí)	8186 (14)	3975 (8)	<0,001
Diabetes (sí)	12997 (22)	5112 (11)	<0,001
Otra (sí)	32607 (48)	18448 (32)	<0,001
Hospitalización (sí)	60402 (90)	11640 (21)	<0,001
Ventilación mecánica (sí)	4891 (13)	360 (1)	<0,001
Admisión UCI (sí)	5848 (10)	578 (1)	<0,001
Defunción (sí)	12288 (18)	2727 (5)	<0,001

¹Análisis sobre los casos de COVID-19 de los que se dispone de información sobre la presencia o ausencia de neumonía. ²RIC: rango intercuartílico. Datos actualizados a 29-05-2020.

Tabla 6. Características según hospitalización en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)¹. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE

Características ¹	Hospitalizados UCI n (%)	Hospitalizados no UCI n (%)	p-valor
Total	7627 (9)	74008 (91)	
Sexo			
Mujer	2300 (30)	33446 (45)	
Hombre	5316 (70)	40409 (55)	<0,001
Edad, mediana (RIC) ²	65 (56-72)	70 (56-81)	<0,001
Grupo de edad (años)			
<2	26 (0)	134 (0)	
2-4	3 (0)	39 (0)	
5-14	22 (0)	107 (0)	
15-29	87 (1)	1391 (2)	
30-39	246 (3)	3219 (4)	
40-49	686 (9)	7104 (10)	
50-59	1515 (20)	11205 (15)	
60-69	2463 (32)	13025 (18)	
70-79	2191 (29)	16469 (22)	
≥80	374 (5)	21152 (29)	<0,001
Enfermedades y factores de riesgo (una o más)	5308 (81)	48534 (79)	<0,001
Enfermedad cardiovascular (sí)	2616 (43)	24446 (41)	0,004
Enfermedad respiratoria (sí)	934 (15)	8857 (15)	0,336
Diabetes (sí)	1538 (25)	13460 (23)	<0,001
Otra (sí)	3070 (40)	34089 (46)	<0,001
Neumonía (radiológica o clínica) (sí)	5837 (91)	48712 (83)	<0,001
Síndrome de distrés respiratorio agudo (sí)	2125 (51)	2974 (8)	<0,001
Defunción (sí)	2342 (31)	12713 (17)	<0,001

¹Análisis sobre los casos de COVID-19 de los que se dispone de información sobre el ingreso en UCI. ²RIC: rango intercuartílico. Datos actualizados a 29-05-2020.

Tabla 7. Características según defunción¹. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE

Características ¹	Defunción n (%)	No defunción n (%)	p-valor
Total	20534 (8)	229739 (92)	
Sexo			
Mujeres	8913 (43)	132658 (58)	
Hombres	11612 (57)	95146 (41)	<0,001
Edad, mediana (RIC) ²	83 (75-89)	58 (44-76)	<0,001
Grupo de edad (años)			
<2	2 (0)	379 (0)	
2-4	0 (0)	193 (0)	
5-14	1 (0)	834 (0)	
15-29	28 (0)	15453 (7)	
30-39	63 (0)	23507 (10)	
40-49	217 (1)	35958 (16)	
50-59	658 (3)	43211 (19)	
60-69	1822 (9)	33375 (15)	
70-79	4890 (24)	28521 (13)	
≥80	12834 (63)	46122 (20)	<0,001
Profesional sanitario (sí)	52 (0)	40909 (27)	<0,001
Hospitalización (sí)	16812 (83)	75301 (34)	<0,001
Admisión UCI (sí)	2342 (13)	5353 (3)	<0,001
Enfermedades y factores de riesgo (una o más)	16897 (95)	86676 (61)	<0,001
Enfermedad cardiovascular (sí)	10133 (60)	33287 (25)	<0,001
Enfermedad respiratoria (sí)	3567 (21)	12887 (10)	<0,001
Diabetes (sí)	5532 (33)	18690 (14)	<0,001
Otra (sí)	11727 (57)	57252 (25)	<0,001
Neumonía (radiológica o clínica) (sí)	12288 (82)	55005 (50)	<0,001
Síndrome de distrés respiratorio agudo (sí)	2345 (27)	3501 (5)	<0,001
Ventilación mecánica (sí)	1943 (18)	3866 (6)	<0,001


¹Porcentaje sobre los casos de COVID-19 de los que se dispone de información sobre las variables señaladas. ²Rango Intercuartílico. Datos actualizados a 29-05-2020.

Tabla 8. Características según nivel de gravedad¹. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE

Características ¹	No hospitalizados n (%)	Hospitalizados n (%)	UCI n (%)	Defunción n (%)
Total	147702 (61,6)	92113 (38,4)	7695 (3,9)	20534 (8,2)
Sexo				
Mujer	94499 (64,0)	40585 (44,1)	2340 (30,4)	8913 (43,4)
Hombre	51999 (35,2)	51363 (55,8)	5344 (69,4)	11612 (56,6)
Edad, mediana (RIC) ²	55 (56-81)	69 (41-75)	65 (41-75)	83 (75-89)
Grupo de edad (años)				
<2	195 (0,1)	175 (0,2)	27 (0,4)	2 (0,0)
2-4	135 (0,1)	46 (0,1)	3 (0,0)	0 (0,0)
5-14	639 (0,4)	146 (0,2)	22 (0,3)	1 (0,0)
15-29	13253 (9,1)	1634 (1,8)	92 (1,2)	28 (0,1)
30-39	18767 (12,8)	3825 (4,2)	251 (3,3)	63 (0,3)
40-49	26047 (17,8)	8709 (9,5)	704 (9,2)	217 (1,1)
50-59	27883 (19,1)	14202 (15,4)	1528 (19,9)	658 (3,2)
60-69	16686 (11,4)	17396 (18,9)	2478 (32,3)	1822 (8,9)
70-79	11810 (8,1)	20787 (22,6)	2195 (28,6)	4890 (23,8)
≥80	30886 (21,1)	25007 (27,2)	381 (5,0)	12834 (62,6)
Enfermedades y factores de riesgo (una o más)	40637 (51,0)	60572 (79,4)	5328 (81,0)	16897 (95,4)
Enfermedad cardiovascular (sí)	13204 (17,5)	29798 (41,2)	2621 (43,1)	10133 (60,4)
Enfermedad respiratoria (sí)	5376 (7,1)	10919 (15,1)	938 (15,4)	3567 (21,3)
Diabetes (sí)	7189 (9,6)	16815 (23,2)	1541 (25,3)	5532 (33,0)
Otra (sí)	11940 (15,9)	19437 (26,9)	1154 (19,0)	6179 (36,8)
Neumonía (radiológica o clínica) (sí)	6797 (13,4)	60402 (83,8)	5848 (91,0)	12288 (81,8)
Ventilación mecánica (sí)	0 (0,0)	5756 (12,0)	3867 (77,4)	1943 (18,4)

¹Análisis sobre los casos de COVID-19 de los que se dispone de información sobre la gravedad. ²RIC: rango intercuartílico. Las categorías no son excluyentes, un mismo caso puede estar representado en más de una columna. Datos actualizados a 29-05-2020.

Figura 6. Distribución por sexo y edad según el nivel de gravedad. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE



Principales resultados

- Desde el inicio de la alerta por SARS-CoV-2, y hasta las 11:00 h del 29 de mayo de 2020 se ha recibido información en SiViES de 250.273 casos de COVID-19 confirmados por cualquier técnica en España diagnosticados antes del 11 de mayo de 2020.
- El 56,6% de los casos de COVID-19 son mujeres y la mediana de edad de los casos es 60 años, siendo mayor en hombres que en mujeres (62 vs 59 años). Los síntomas más frecuentes que se refieren son fiebre, tos, disnea y escalofríos; un tercio de los casos presentó clínica digestiva (diarrea o vómitos). Los hombres presentan una mayor prevalencia de fiebre y disnea, mientras que el dolor de garganta y la clínica digestiva son significativamente más frecuentes en mujeres. Un 38,4% de los casos notificados a SiViES han sido hospitalizados, 54% han desarrollado neumonía, un 3,9% han sido admitidos en UCI y un 8,2% han fallecido. Los hombres presentan una mayor prevalencia de neumonía, enfermedades de base (cardiovascular, respiratoria, diabetes, hipertensión) y un mayor porcentaje de hospitalización, admisión en UCI, ventilación mecánica y letalidad que las mujeres. Se estima que un 7,5% de pacientes necesitan ventilación mecánica, 10,6% en hombres y 4,7% en mujeres.
- La distribución por sexo y grupo de edad indica que los casos de COVID-19, con respecto a la distribución de la población española, están sobrerrepresentados entre los mayores de 50 años, tanto en hombres como en mujeres. En las mujeres llama la atención de forma más acusada entre los 45 y 65 años, y en los hombres a partir de los 60 años. Por el contrario, la presentación de casos de COVID-19 en menores de 25 años de ambos sexos es muy baja.
- Un 24,1% de los casos notificados a SiViES son personal sanitario (dato calculado sobre los casos que tenían información sobre esta variable), siendo significativamente mayor este porcentaje entre las mujeres que entre los hombres (32% vs 13%). El 76% del personal sanitario con COVID-19 son mujeres.
- En un análisis específico sobre neumonía se observa que los pacientes con neumonía son significativamente mayores que los que no presentan neumonía (67 vs 53 años, respectivamente). Los hombres, las personas mayores de 60 años y las que presentan enfermedad de base (especialmente enfermedad cardiovascular y diabetes) están más representados entre los pacientes que presentan neumonía. Como es de esperar, los porcentajes de hospitalización, ventilación mecánica, admisión en UCI y defunción son significativamente mayores en los casos con neumonía.
- Los pacientes ingresados en UCI son significativamente más jóvenes que los hospitalizados sin ingreso en UCI (edad mediana 65 vs 70 años), siendo el porcentaje de pacientes mayores de 80 años con ingreso en UCI del 5% frente al 29% en el grupo de hospitalizados sin ingreso en UCI. Entre los ingresados en UCI, frente a los hospitalizados sin ingreso en UCI, están más representados los hombres y existe una mayor prevalencia de enfermedades de base, neumonía y otras complicaciones respiratorias.
- En un análisis específico sobre defunción se observa que los pacientes fallecidos, frente a los no fallecidos, son significativamente mayores (edad mediana 83 vs 58 años), los hombres están más representados, presentan más frecuentemente enfermedades de base, neumonía y otras complicaciones respiratorias, y han sido hospitalizados e ingresados en UCI con mayor frecuencia. El 87% de los pacientes que fallecen tienen más de 70 años, el 95% de los mismos presentaban algún tipo de enfermedad de base previa y el 60% padecían una enfermedad cardiovascular.
- En una escala de gravedad de 1) casos no hospitalizados, 2) casos hospitalizados, 3) casos admitidos en UCI y 4) fallecidos, se observa que el porcentaje de pacientes mayores de 70 años aumenta de 29% en pacientes no hospitalizados a 87% en pacientes fallecidos. A medida que aumenta la gravedad se observa también un mayor porcentaje de hombres y de pacientes con enfermedad de base. La prevalencia de enfermedad de base es de 51% en los casos no hospitalizados, 79% en los casos hospitalizados, 81% en los ingresados en UCI y 95% en los fallecidos. En definitiva, los hombres, los

pacientes de mayor edad y con enfermedades de base y factores de riesgo están más representados a medida que aumenta la gravedad. La enfermedad cardiovascular es la que presenta mayor prevalencia entre los pacientes de COVID-19 hospitalizados (41%), en UCI (43%) y fallecidos (60%).

- En la pirámides de distribución de casos por sexo y edad en función de la gravedad se observa un predominio de mujeres en los casos no hospitalizados y de hombres en los que requieren hospitalización. El número de casos hospitalizados y no hospitalizados, por debajo de los 25 años, es bajo en ambos sexos. La mayoría de casos hospitalizados sin ingreso en UCI ni defunción, así como los casos con ingreso en UCI o defunción, se dan entre hombres, superando ampliamente a la proporción de mujeres a partir de los 45 años, y de forma más acusada a partir de los 70 años.

Nota metodológica

Desde el principio de la pandemia de COVID-19, la vigilancia de los casos de esta enfermedad en España se basa en la notificación universal de todos los casos confirmados de COVID-19 que se identifican en cada CCAA. Las CCAA notifican al nivel central esta información de dos formas diferentes:

- Una notificación diaria del número de casos agregados de COVID-19 por CCAA al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) del Ministerio de Sanidad. Los datos contienen información sobre casos totales, casos en profesionales sanitarios, hospitalizados, admisiones en UCI, fallecidos y recuperados.
- Una notificación individualizada de casos de COVID-19 a la RENAVE a través de la plataforma informática vía Web SiViES que gestiona el Centro Nacional de Epidemiología (CNE). Esta información procede de la encuesta epidemiológica de caso que cada CA cumplimenta ante la identificación de un caso de COVID-19 y contiene datos demográficos, epidemiológicos y clínicos de los casos de COVID-19 identificados en España. Para conseguir una información completa de cada caso, la CA debe realizar sucesivas actualizaciones de la información de la encuesta porque no siempre toda la información está disponible desde la identificación del caso, o precisa de una actualización según cambia la evolución clínica del paciente. Las actualizaciones de la información de los casos las realizan las CCAA, según disponen de ellas, en la plataforma SiViES mediante un determinado soporte electrónico. Para ello, las CCAA reciben el apoyo permanente del equipo SiViES del CNE. Sin embargo, la situación de intensísima carga de trabajo en todas la Unidades de Salud Pública de las CCAA implica un esfuerzo muy importante para lograr la notificación individualizada a la RENAVE, especialmente, su actualización para completar la información de la encuesta epidemiológica de caso.

Mientras que la notificación agregada se acerca más a la realidad de la evolución de la pandemia de COVID-19 en España, la información de la RENAVE es todavía incompleta, si bien puede ofrecer una información más precisa sobre las características epidemiológicas y clínicas o los factores de riesgo y enfermedades de base que podrían estar asociados a los casos de COVID-19 identificados en España.

Los datos agregados de COVID-19 se pueden consultar en: <https://covid19.isciii.es/>

La información individualizada debe ser consolidada con sucesivas actualizaciones para evitar interpretaciones erróneas durante su análisis.

Es importante resaltar que todos los resultados son provisionales y deben interpretarse con precaución, porque se ofrece información de cada variable con la información disponible para cada una de ellas. En el caso de “defunción”, hemos considerado como “no defunción” los casos sin información en esta variable, y deben ser confirmados en posteriores análisis.

Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas. MoMo

MoMo es un sistema de vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas que proporciona información sobre el impacto en la mortalidad de la población de todo evento que pueda suponer una amenaza para la Salud Pública. Sus resultados pueden apoyar las evaluaciones de riesgo de dichos eventos y contribuir a guiar adecuadamente la respuesta de salud pública y el desarrollo de políticas de control.

Mediante el sistema MoMo, el Centro Nacional de Epidemiología estima los excesos de mortalidad por todas las causas por sexo y grupos de edad y a nivel nacional y por CCAA. Los resultados son estimaciones de exceso de defunciones por todas las causas, es decir, son excesos de defunciones de carácter inespecífico que no se pueden atribuir directamente a una causa determinada.

Por otra parte, en el momento actual observamos un retraso en la notificación de defunciones en los registros civiles de varias CCAA, por lo que los resultados deben interpretarse con precaución, especialmente en los últimos días y siempre deben ser confirmados con el análisis de los próximos días.

Las estimaciones de MoMo pueden consultarse aquí: [Informes MoMo 2020](#)